

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

АРТИЦИД (ARTYCID)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
(РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА АВ-05375-03-14)

широкого спектра действия, активный ко всем возбудителям инфекционных болезней и характеризующийся моющими свойствами.

Состав:

100 мл препарата содержат действующие вещества:

БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД	17,5 г;
ГЛУТАРОВЫЙ АЛЬДЕГИД	11,5 г
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНИЯ ХЛОРИД	8,0 г

Фармакологические свойства.

Препарат обладает активным бактерицидным действием по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *E. coli*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus hirae* и другие), вирулицидное действие к болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus), болезни Аujeszky (Aujeszky's disease virus), болезни Тешена (Teschovirus), парвовирусной инфекции свиней (Parvovirus disease), фунгицидное действие (*Candida albicans*, *Candida famata*, *Aspergillus niger* и другие), спороцидное (микроорганизмы рода *Bacillus*).

Показания к применению.

- Средство применяют для профилактической, текущей, заключительной и вынужденной дезинфекций всех видов животноводческих и птицеводческих помещений, убойных и мясоперерабатывающих цехов, транспортных средств, дезбарьеров и других объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору;
- в очагах инфекции бактериальной, вирусной и грибковой этиологии;
- в клинических, биохимических, бактериологических, серологических и других профильных лабораториях и ветеринарных клиниках;
- в аптеках та аптечных ветеринарных складах;
- в животноводческих помещениях;
- на мясомолочных и молокоперерабатывающих предприятиях;
- на складах, элеваторах и зернохранилищах;
- на предприятиях и объектах общественного питания и торговли;
- на всех видах транспорта (автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного и других), вокзалах, станциях и на объектах ихного обеспечения, подлежащих ветеринарному контролю и надзору;
- для дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования;
- на предприятиях по сбору, транспортировке, сортировке и переработке мусора;
- для дезинфекции мусоропроводов, мусоросборных камер и контейнеров;
- для санитарной и специальной одежды персонала;
- как дополнительное средство в производстве лекарственных и косметических препаратов;
- у быту.

Дозы и способы применения.

Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания. Рабочие растворы готовят путём добавления соответствующих количеств средства к водопроводной воде.

Растворы готовят добавлением соответствующего количества препарата к водопроводной воде (температурой 10 - 35°C), затем раствор перемешивают.

Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Количество препарата/воды, л			
	На 10 л рабочего раствора		На 100 л рабочего раствора	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
2,0	0,2	9,8	2,0	98,0

Дезинфекцию проводят методом протирания, орошения и аэрозольного распыления.

Для профилактической дезинфекции используют 0,5 % водный раствор препарата из расчёта 0,25 - 0,3 л/м² площади. Экспозиция составляет 60 минут.

Для проведения вынужденной и заключительной дезинфекции при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии используют 1 % водный раствор препарата при расходе 0,3-0,4 л/м² площади. Экспозиция составляет 2 часа.

Для проведения дезинфекции при грибковых заболеваниях средство применяют в виде 2 % водного раствора из расчёта 0,3 – 0,5 л/м² площади. Экспозиция составляет 3 часа.

Дезинфекцию животноводческих помещений при инфекционных заболеваниях, вызванных спорообразующими микроорганизмами рода *Bacillus*, проводят 3 % водным раствором препарата с расходом 1 л/м² при экспозиции 3 часа.

Аэрозольную дезинфекцию проводят 50 % водным раствором препарата способом высокодисперсного (размер частиц 0,5 – 25 мк) аэрозольного распыления (туманирования) из расчёта 1,5 мл/м³ помещения. Экспозиция составляет 6 часов.

Температура воздуха в помещении должна быть не менее 15°C, относительная влажность не менее 60-65 %. При более низкой влажности воздуха сначала распыляют аэрозоль водопроводной воды из расчёта 10 мл/м³ помещения.

После проведения дезинфекции открывают двери, окна и включают принудительную вентиляцию.

Для обработки инкубационного оборудования методом орошения используют 0,5 % раствор Артицида.

Дезинфекцию транспортных средств, используемых для перевозки животных, сырья и готовой продукции, проводят 0,5 % раствором дезинфицирующего средства при норме расхода 0,3 л/м² и экспозиции 20 минут.

Для заполнения дезбарьеров и дезковриков используют 1,0 % рабочий раствор препарата, который заменяют по мере загрязнения или каждые 7 суток.

После проведения дезинфекции необходимо проветрить помещение и промыть водой все поверхности, которые будут контактировать с кормами и питьевой водой.

Рекомендуемые концентрации в зависимости от типа инфекции

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ (<i>SALMONELLA</i> , <i>PSEUDOMONAS</i> , <i>CLOSTRIDIUM</i>)	0,5–1,0 %
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (<i>NEWCASTLE</i> , <i>AJESZKY</i> , <i>PARVOVIRUS</i>)	0,5–1,0 %
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ (<i>CANDIDA</i> , <i>ASPERGILLUS</i>)	2,0 %
СПОРООБРАЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ (<i>BACILLUS</i>)	3,0 %
ПРОФИЛАКТИКА/ТРАНСПОРТ	0,5–1,0 %
АЭРОЗОЛЬ	10,0-15,0 %

Специальные предостережения.

При использовании препарата в термическом туманогенераторе появляется острый неприятный запах.

После выдержки времени экспозиции помещение необходимо проветрить.

Оборудование и инвентарь, используемые при кормлении птицы и животных (кормушки, корыта, поилки и т.п.), до начала влажной дезинфекции освобождают от остатков корма и воды. Перед повторным использованием их ополаскивают водой.

Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала

К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет. Дезинфекцию проводят с соблюдением мер защиты органов дыхания, кожи и глаз (спецодежда, универсальный респиратор, защитные очки, резиновые перчатки). Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в проветриваемом помещении при наличии воды. В случае попадания средства в глаза их промывают большим количеством воды и закапывают 20 % раствором сульфацила натрия (альбуцида), при болях – 1-2 % раствором новокаина. В случае случайного попадания препарата на кожу необходимо тщательно промыть поражённый участок проточной водой, после чего смазать кожу пом'якшающим кремом.

При случайном попадании средства в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля и обратиться к врачу.

Запрещается курить, пить, принимать пищу во время выполнения работ по дезинфекции. После окончания работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

Формы несовместимости (основные).

Не применять одновременно с другими дезинфицирующими средствами. Не совместим с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, концентрированными растворами хлора, окислителями.

Особые меры хранения.

Хранить в таре производителя, в недоступном для детей месте при температуре от 5 до 20 °C в сухих тёмных, хорошо вентилируемых складских помещениях в защищённом от попадания прямых солнечных лучей месте.

Природа и состав контейнера первичной упаковки.

Канистры из полиэтилена объемом 1, 2, 5, 10, 20 л.

Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным препаратом или его остатками.

Неиспользованное средство до следующего проведения дезинфекции хранят в плотно закрытой таре в местах, недоступных для детей и животных.

В случае превышения срока хранения концентрата или накопления отработанных объемов раствора их необходимо разбавить питьевой водой до безопасной концентрации (0,01%), смыть в канализацию или засыпать негорючим адсорбентом (песок, земля и т.п.) и вывезти на полигон обезвреживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «АРТИЦИД»

- Сочетание уникальной композиции альдегидов и дидецилдиметиламмония хлорида обеспечивает широкий спектр активности в отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий, грибов и оболочечных/безоболочечных вирусов;
- Механизм действия основывается на образовании белковых сшивок между аминокислотами, что блокирует ферментативную активность микроорганизмов, кроме того происходит разрушение липидного слоя мембраны и межмолекулярных связей;
- Применяется для всех типов поверхностей;
- Не вызывает коррозию;
- Эффективность не утрачивается в жесткой воде;
- Характеризуется значительной бактерицидной активностью;
- Неотъемлемый компонент в контроле вируса птичьего гриппа.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИКЛ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Механическая очистка.
- Первичное ополаскивание водой.
- Моющие средства (ФОМКЛИН/АВКЛИН 0,8–1,5 % – основная мойка 5–30 мин).
- Очень тщательное ополаскивание чистой водой.
- Высушивание (рекомендуется).
- Дезинфекция (Артицид 1,0–3,0 % по инструкции).
- Заключительное проветривание / высушивание.

СХЕМЫ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ЗАСОБАМИ SANFORT с полной ротацией препаратов

LIVING HENS (БРОЙЛЕРЫ / ИНДЕЙКИ) ВАРИАНТ 1 КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ГАРАНТИЯ БИОБЕЗОПАСНОСТИ	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	АРТИЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ИОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30 мин
КОРМЛЕНИЕ	ЛИАЦИД 1 мл/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРИАНТ 2 БИОБЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ПТИЦЫ	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	АРТИЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ИОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 мин
КОРМЛЕНИЕ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корма или 300–1000 мл/т воды

ДЕТОКСИКАЦИЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Тщательная подготовка помещений (ликвидация сквозняков).
- Максимальная очистка поверхности, подлежащей дезинфекции, с применением детергентов.
- Соблюдение температурного режима воздуха и поверхности: минимальная – 12°C; оптимальная – 18–22; максимальная – 25°C.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении должна составлять 50 % и более.
- Контроль дисперсности аэрозолей.
- Распыление аэрозолей необходимо проводить из нескольких мест помещения.
- Подбор дезинфицирующих средств в зависимости от чувствительности микроорганизмов.

ВАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Наиболее эффективное нанесение – орошением или пенообразователем: обеспечивает контакт с вертикальными поверхностями.
- После экспозиции обязательно проветрить помещение и промыть водой поверхности, контактирующие с кормами/водой.
- Не смешивать с мылами, анионными ПАВ, хлором, окислителями – применять последовательно с промывкой между этапами.
- При аэрозольной обработке появляется острый запах – после экспозиции проветрить.
- Хранить в таре производителя при 5–20°C, срок годности 2 года.

Наименование и местонахождение производителя

ООО "САНФОРТ-П"

02081, м. Киев, ул. Здолбуновская, д. 7Д, корп. В.

Тел.: +38 097 420 9999

Email: sanfortp@gmail.com