

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

КРЕЗОДЕЗ (KRESODEZ)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

(РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АВ-09494-03-21)

Органический препарат широкого спектра действия, активный ко всем возбудителям инфекционных болезней, обладающий антипротозойными свойствами



Состав

100 мл препарата содержит действующие вещества:

МЕТАКРЕЗОЛ	19,2 %
НАТРИЯ ГИДРОКСИД	20,0 %

Вспомогательные вещества: ортокрезол, вода.

Фармакологические свойства

Препарат обладает активным бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus faecalis*, *Enterobacter aerogenes*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium perfringens*), фунгицидным действием (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*), вирулицидным действием против болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus), болезни Аujeszки (Aujeszky's disease virus), болезни Тешена (Teschovirus), парвовирусной инфекции свиней (Parvovirus disease), а также антипротозойным действием (*Eimeria* spp.).

Показания к применению

Средство применяют для профилактической, вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции всех видов животноводческих и птицеводческих помещений, транспортных средств, дезбарьеров, оборудования и других объектов, подлежащих ветеринарному надзору, а также для дезинвазии помещений при протозойных заболеваниях (кокцидиоз).

Дозы и способы применения

Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей. Рабочие растворы готовят путём добавления необходимого количества препарата к водопроводной воде. Дезинфекцию проводят методом орошения и протирания.

Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Количество препарата/воды, л			
	На 10 л (препарат / вода, л)		На 100 л (препарат / вода, л)	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
2,0	0,2	9,8	2,0	98,0
4,0	0,4	9,6	4,0	96,0

Основные режимы применения

Профилактическая дезинфекция — 0,5–1,0 % раствор, 0,25–0,3 л/м², экспозиция 1–3 часа.

Вынужденная/заключительная при бактериальных инфекциях (кроме туберкулёза) — 1,0–1,5 % раствор, 0,3–0,5 л/м², экспозиция 3 часа.

При грибковых заболеваниях — 2,0 % раствор, 0,3–0,5 л/м², экспозиция 3 часа.

Дезинвазия при протозойных заболеваниях (*Eimeria* spp.) — 4,0 % раствор, 0,3–0,5 л/м², экспозиция 6 часов.

Заправка дезбарьеров и дезковриков — 0,5–1,0 % раствор (замена 1 раз в неделю или при загрязнении).

После экспозиции места возможного накопления остатков (кормушки, поилки) промыть водой.

Рекомендуемые концентрации в зависимости от типа инфекции

Бактериальные инфекции	1,0–1,5 %
Грибковые инфекции	2,0 %
Протозойные инфекции (кокцидиоз)	4,0 %
Профилактика / дезбарьеры	0,5–1,0 %

Специальные предостережения

Не применять в присутствии животных и птицы. При использовании препарата появляется острый неприятный запах — после обработки помещение обязательно проветрить. Не применять одновременно с другими дезинфицирующими средствами. Антимикробная активность снижается при наличии неионных ПАВ.

Специальные предостережения для лиц обслуживающего персонала

К работе не допускаются лица моложе 18 лет. Дезинфекцию методом орошения проводить в спецодежде, универсальном респираторе, защитных очках, резиновых перчатках. Приготовление растворов — в проветриваемом помещении. При попадании в глаза — промыть проточной водой 10–15 мин и обратиться к врачу. При попадании на кожу — промыть водой и смазать кремом. При попадании в желудок — выпить несколько стаканов воды с 10–20 таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Запрещается курить, пить, есть во время работы. После работы вымыть руки и лицо с мылом.

Формы несовместимости

Несовместим с другими дезинфицирующими средствами, неионными ПАВ.

Особые меры хранения

Хранить в таре производителя при температуре от 8 °C до 20 °C в сухих, тёмных, вентилируемых помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей. Срок годности — 2 года.

Форма выпуска

Флаконы и канистры из полимерных материалов ёмкостью 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, бочки по 200 л.

Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным препаратом

Неиспользованное средство хранить в плотно закрытой таре. Остатки разбавить водой до безопасной концентрации и смыть в канализацию или засыпать адсорбентом и вывезти на полигон.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «КРЕЗОДЕЗ»

- Мощное бактерицидное, фунгицидное, вирулицидное и антипротозойное действие (включая Eimeria spp.).
- Эффективен против кокцидий и яиц насекомых.
- Применяется для всех типов поверхностей.
- Высокая устойчивость к органическим загрязнениям.
- Незаменимый компонент первичной дезинфекции в схемах биобезопасности птицеводства и животноводства.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИКЛ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Механическая очистка.
- Первичное смывание водой.
- Моющие средства (ФОМКЛИН / АВИКЛИН 0,8–1,5 % → 15–30 мин).
- Тщательное промывание чистой водой.
- Высушивание (рекомендуется).
- Дезинфекция (КРЕЗОДЕЗ 1,0–4,0 % по инструкции).
- Заключительное проветривание / высушивание.

СХЕМЫ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СРЕДСТВАМИ SANFORT с полной ротацией препаратов

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРЫ / ИНДЕЙКИ) ВАРИАНТ 1	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	АРТИЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 30 мин
КОРМЛЕНИЕ	ЛИАЦИД 1 мл/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня

LONG LIVING HENS (РОДИТЕЛИ / НЕСУШКА) ВАРИАНТ 2	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ (РАЗРУШЕНИЕ ЯИЦ НАСЕКОМЫХ И КОКЦИДИЙ)	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 2–3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ / ГАЗАЦИЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30–60 мин
КОРМЛЕНИЕ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корма
ДЕТОКСИКАЦИЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня

ВАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Наиболее эффективное нанесение — методом орошения.
- После экспозиции обязательно проветрить помещение.
- Места контакта с кормами/водой промыть водой.
- Хранить при 8–20 °С, срок годности 2 года.

Наименование и местонахождение производителя

ООО "САНФОРТ-П"
 02081, г. Киев, ул. Здолбуновская, д. 7Д, корпус В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com

