

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

САНФОРТ-ДЕЗ (SANFORT-DEZ)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

(РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО АВ-04559-03-13 ОТ 07.09.2023 Г.)

широкого спектра действия, активное ко всем возбудителям инфекционных болезней и характеризующееся моющими свойствами.

Состав

100 мл препарата содержат действующие вещества:

ГЛУТАРОВЫЙ АЛЬДЕГИД	17,4 г
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНИЯ ХЛОРИД	6,4 г
ФОРМАЛЬДЕГИД	17,2 г

Фармакологические свойства.

Препарат обладает активным бактерицидным действием по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus hirae* и другие), фунгицидное действие (*Candida albicans*, *Aspergillus flavus* и другие), спороцидное (микроорганизмы рода *Bacillus*) и вирулицидное действие, включая вирусы Avian influenza, Myxomatose virus, Newcastle disease virus.

Показания к применению.

Средство применяют для профилактической, текущей, заключительной и вынужденной дезинфекций всех видов животноводческих и птицеводческих помещений, убойных и мясоперерабатывающих цехов, транспортных средств, дезбарьеров и других объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору:

- в очагах инфекции бактериальной, вирусной и грибковой этиологии;
- в клинических, биохимических, бактериологических, серологических и других профильных лабораториях и ветеринарных клиниках;
- в аптеках и аптечных ветеринарных заведениях;
- в животноводческих помещениях;
- на мясомолочных и молокоперерабатывающих предприятиях;
- на складах, элеваторах и зернохранилищах;
- на предприятиях и объектах общественного питания и торговли;
- на всех видах транспорта (автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного), вокзалах, станциях и на объектах их обеспечения;
- для дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования;
- на предприятиях по сбору, транспортировке, сортировке и переработке мусора;
- для дезинфекции мусоропроводов, мусоросборных камер и контейнеров;
- для санитарной и специальной одежды персонала;
- как дополнительное средство в производстве лекарственных и косметических препаратов;
- в быту.

Дозы и способы применения.

Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания. Рабочие растворы готовят путём добавления соответствующих количеств средства к водопроводной воде (температурой 10–35 °C), затем раствор перемешивают.

Таблица приготовления рабочих растворов

Концентрация, %	Количества препарата/воды, л			
	На 10 л раствора (препарат / вода, л)		На 100 л раствора (препарат / вода, л)	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
1,25	0,125	9,875	1,25	98,75
2,25	0,225	9,775	2,25	99,5
3,0	0,3	9,7	3,0	97,0
50,0	5,0	5,0	50,0	50,0

Дезинфекцию проводят методом протирания, орошения и аэрозольного распыления.

Профилактическая дезинфекция - 0,5 % раствор, 0,25–0,3 л/м², экспозиция 30–60 мин.

Вынужденная/заключительная при бактериальных инфекциях - 1,0 % раствор, 0,3–0,4 л/м², экспозиция 2 часа.

При вирусных 1,25 % и грибковых заболеваниях - 2,25 % раствор, 0,3–0,5 л/м², экспозиция 3 часа.

При спорообразующих микроорганизмах (*Bacillus subtilis*) - 3,0 % раствор, 1 л/м², экспозиция 3 часа.

Аэрозольная дезинфекция - 50 % раствор, 1,5 мл/м³, экспозиция 6 часов (температура ≥ 15 °C, влажность ≥ 60 %; при более низкой влажности предварительно распылить воду 10 мл/м³).

Дезинфекция транспортных средств - 0,5 % раствор, 0,3 л/м², экспозиция 20 минут.

Заправка дезбарьеров и дезковриков - 0,5 % раствор (замена каждые 7 суток или при загрязнении).

Дезинвазия помещений, выгульных дворов и площадок с твёрдым покрытием - 2 % раствор, 500 мл/м², экспозиция 2 часа.

После дезинфекции обязательно проветрить помещение и промыть водой все поверхности, которые будут контактировать с кормами и питьевой водой.

Рекомендуемые концентрации в зависимости от типа инфекции.

Бактериальные инфекции	1,0 %
Вирусные инфекции	1,25 %
Грибковые инфекции	2,25 %
Спорообразующие бактерии	3,0 %
Профилактика / транспорт	0,5 %
Аэрозоль	10,0–15,0 %

Специальные предостережения.

Не применять в присутствии животных и птицы. При использовании в термическом туманогенераторе появляется острый неприятный запах – после экспозиции помещение необходимо проветрить. Оборудование и инвентарь для кормления освободить от остатков корма и воды перед дезинфекцией.

Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала.

К работе не допускаются лица моложе 18 лет. Работы проводить в спецодежде, универсальном респираторе, защитных очках, резиновых перчатках. При попадании в глаза промыть водой и закапать 20 % раствор сульфацила натрия (при болях - 1–2 % новокаин). При попадании на кожу промыть водой и смазать кремом. При попадании в желудок – выпить воду с активированным углём (10–20 таблеток) и обратиться к врачу. Запрещается курить, пить, есть во время работы. После работы вымыть руки и лицо с мылом.

Формы несовместимости.

Не применять одновременно с другими дезинфицирующими средствами. Не совместим с мылами, анионными ПАВ, концентрированными растворами хлора, окислителями.

Особые меры хранения.

Хранить в таре производителя при температуре от 5 °C до 20 °C в сухих, тёмных, хорошо вентилируемых помещениях, защищённых от прямого солнечного излучения. Срок годности - 2 года.

Форма выпуска.

Канистры из полиэтилена ёмкостью 1, 2, 5, 10, 20 л.

Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным препаратом.

Неиспользованное средство хранить в плотно закрытой таре. Остатки разбавить водой до 0,01 % и смыть в канализацию или засыпать адсорбентом и вывезти на полигон.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «САНФОРТ-ДЕЗ»

- Сочетание глutarового альдегида, формальдегида и дидецилдиметиламмония хлорида обеспечивает мощное бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное и спороцидное действие.
- Высокая эффективность против вируса птичьего гриппа.
- Применяется для всех типов поверхностей.
- Не вызывает коррозию.
- Эффективен в жёсткой воде.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИКЛ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. Механическая очистка
2. Первичное ополаскивание водой
3. Моющие средства (ФОМКЛИН / АВКЛИН 0,8–1,5 % → 15–30 мин)
4. Тщательное ополаскивание чистой водой
5. Высушивание (рекомендуется)
6. Дезинфекция (САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–3,0 % по инструкции)
7. Заключительное проветривание / высушивание



СХЕМЫ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СРЕДСТВАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРЫ / ИНДЕЙКИ) ВАРИАНТ 1	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–1,25 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ИОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30 мин
КОРМЛЕНИЕ	ЛИАЦИД 1 мл/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня
LONG LIVING HENS (РОДИТЕЛИ / НЕСУШКА) ВАРИАНТ 2	
ПЕРВИЧНАЯ МОЙКА	ФОМКЛИН 1–3 %
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛИНИЙ ПОЕНИЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 ч
ПЕРВИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–2,25 %, 0,3–0,5 л/м ² , 2–3 ч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ГАЗАЦИЯ	ИОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30–60 мин
КОРМЛЕНИЕ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦИЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корма
ПРОФИЛАКТИКА	ЭКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дня

ВАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Наиболее эффективное нанесение — орошением или пенообразователем.
- После экспозиции обязательно проветрить и промыть поверхности, контактирующие с кормами/водой.
- Не смешивать со щелочными средствами, хлором, окислителями.
- Хранить при 5–20 °С, срок годности 2 года.

Наименование и местонахождение производителя

ООО "САНФОРТ-П"
 02081, г. Киев, ул. Здолбуновская, д. 7Д, корп. В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com