

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

АРТИЦИД (ARTYCID)

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

(РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ АВ-05375-03-14)

широкого спектру дії, який активний до всіх збудників інфекційних хвороб та характеризується мийними властивостями.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

БЕНЗАЛКОНІУ ХЛОРИД	17,5 г;
ГЛУТАРОВИЙ АЛЬДЕГІД	11,5 г
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНІУ ХЛОРИД	8,0 г

Фармакологічні властивості.

Препарат має активну бактерицидну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *E. coli*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus hirae* та інші), віруліцидну дію до хвороби Ньюкасла (Newcastle disease virus), хвороби Аїєскі (Aujeszky's disease virus), хвороби Тешена (Teschovirus), парвовірусної інфекції свиней (Parvovirus disease), фунгіцидну дію (*Candida albicans*, *Candida famata*, *Aspergillus niger* та інші), спороцидну (мікроорганізми роду *Bacillus*).

Показання до застосування.

Засіб застосовують для профілактичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекцій усіх видів тваринницьких і птахівничих приміщень, забійних і м'ясопереробних цехів, транспортних засобів, дезбар'єрів та інших об'єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду:

- у вогнищах інфекції бактеріальної, вірусної і грибової етіології;
- у клінічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних й інших профільних лабораторіях і ветеринарних клініках;
- в аптеках та аптекних ветеринарних закладах;
- у тваринницьких приміщеннях;
- на м'ясомолочних та молокопереробних підприємствах;
- на складах, елеваторах і зернохвищах;
- на підприємствах та об'єктах громадського харчування і торгівлі;
- на всіх видах транспорту (автомобільного, авіаційного, залізничного, водного і інших), вокзалах, станціях і на об'єктах їхнього забезпечення, що підлягають ветеринарному контролю та нагляду;
- для дезінфекції систем вентиляції, кондиціонування;
- на підприємствах із збирання, транспортування, сортування та переробки сміття;
- для дезінфекції сміттєпроводів, сміттєзбиральних камер і контейнерів;
- для санітарного та спеціального одягу персоналу;
- як додатковий засіб у виробництві лікарських і косметичних препаратів;
- у побуті.

Дози і способи застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження. Робочі розчини готують шляхом додавання відповідних кількостей засобу до водопровідної води. Розчини готують додаванням відповідної кількості препарату до водопровідної води (температурою 10 - 35°C), потім розчин перемішують.

Концентрація робочого розчину по препарату, %	Кількість препарату/води, л			
	На 10 л робочого розчину		На 100 л робочого розчину	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
2,0	0,2	9,8	2,0	98,0

Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення та аерозольного розпилення.

Для профілактичної дезінфекції використовують 0,5 % водний розчин препарату з розрахунку 0,25 - 0,3 л/м² площі. Експозиція становить 60 хвилин.

Для проведення вимушеної та заключної дезінфекції при інфекційних захворюваннях бактеріальної етіології використовують 1 % водний розчин препарату при витраті 0,3-0,4 л/м² площі. Експозиція складає 2 години.

Для проведення дезінфекції при грибкових захворюваннях засіб застосовують у вигляді 2 % водного розчину з розрахунку 0,3 – 0,5 л/м² площі. Експозиція становить 3 години.

Дезінфекцію тваринницьких приміщень при інфекційних захворюваннях викликаних спороутворюючими мікроорганізмами роду *Bacillus*, проводять 3 % водним розчином препарату з розрахунку 1 л/м² при експозиції 3 години.

Аерозольну дезінфекцію проводять 50 % водним розчином препарату способом вискодисперсного (розмір часток 0,5 – 25 мк) аерозольного розпилення (затуманення) із розрахунку 1,5 мл/м³ приміщення. Експозиція складає 6 годин.

Температура повітря в приміщенні повинна бути не менше 15°C, відносна вологість не менше 60-65 %. При нижчій вологості повітря спочатку розпилюють аерозоль водопровідної води із розрахунку 10 мл/м³ приміщення.

Після проведення дезінфекції відкривають двері, вікна і вмикають примусову вентиляцію.

Для обробки інкубаційного обладнання методом зрошення використовують 0,5 % розчин Артіциду.

Дезінфекцію транспортних засобів, які використовують для перевезення тварин, сировини та готової продукції, проводять 0,5 % розчином дезінфікуючого засобу при нормі витрати 0,3 л/м² та експозиції 20 хвилин.

Рекомендовані концентрації залежно від типу інфекції

Бактеріальні інфекції (<i>Salmonella</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Clostridium</i>)	0,5–1,0 %
ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ (<i>NEWCASTLE</i> , <i>AUJESZKY</i> , <i>PARVOVIRUS</i>)	0,5–1,0 %
ГРИБКОВІ ІНФЕКЦІЇ (<i>CANDIDA</i> , <i>ASPERGILLUS</i>)	2,0 %
СПОРОУТВОРЮЮЧІ БАКТЕРІЇ (<i>BACILLUS</i>)	3,0 %
ПРОФІЛАКТИКА/ТРАНСПОРТ	0,5–1,0 %
АЕРОЗОЛЬ	50,0 %

Спеціальні застереження.

При використанні препарату в термічному туманогенераторі з'являється гострий неприємний запах. Після витримки часу експозиції приміщення необхідно провітрити.

Обладнання та інвентар, які використовують при годуванні птиці та тварин (годовниці, корита, поїлки тощо) до початку вологої дезінфекції звільняють від залишків корму та води. Перед повторним використанням їх ополіскують водою.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

До роботи із засобом не допускають осіб молодше 18 років. Дезінфекцію проводять із дотриманням заходів захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, універсальний респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). Приготування робочих розчинів необхідно проводити у провітрянному приміщенні при наявності води. У разі потрапляння засобу в очі, їх промивають великою кількістю води і закачують 20 % розчином сульфацилу натрію (альбуциду), при болях - 1-2 % розчином новокаїну. У разі випадкового потрапляння препарату на шкіру, потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, після цього змастити шкіру пом'якшуючим кремом.

При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно дати випити постраждалому декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля та звернутись до лікаря.

Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з дезінфекції. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

Форми несумісності (основні).

Не застосовувати одночасно з іншими дезінфікуючими засобами. Не сумісний з милами, аніонними поверхнево-активними речовинами, концентрованими розчинами хлору, окисниками.

Особливі заходи зберігання.

Зберігати в тарі виробника, в недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 20 °C у сухих темних, добре вентильованих складських приміщеннях в захищеному від попадання прямих сонячних променів місці.

Природа і склад контейнера первинного упакування.

Каністри з поліетилену об'ємом 1, 2, 5, 10, 20 л.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками.

Невикористаний засіб до наступного проведення дезінфекції зберігають у щільно закритій тарі у місцях, недоступних для дітей і тварин.

У разі перевищення терміну зберігання концентрату або накопичення відпрацьованих об'ємів розчину їх треба розбавити питною водою до безпечної концентрації (0,01%), змити в каналізацію або засипати него-рючим адсорбентом (пісок, земля тощо) та вивезти на полігон знешкодження.

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «АРТІЦИД»

- Поєднання унікальної композиції альдегідів та дидецилдиметиламоній хлориду забезпечує широкий спектр активності щодо грампозитивних, грамнегативних бактерій, грибів та оболонкових/безоболонкових вірусів;
- Механізм дії базується на утворенні білкових сшивок між амінокислотами, що блокує ферментативну активність мікроорганізмів, крім того відбувається руйнація ліпідного шару мембрани та міжмолекулярних зв'язків;
- Застосовується для всіх типів поверхонь;
- Не спричинює корозію;
- Ефективність не втрачається у жорсткій воді;
- Характеризується значною бактерицидною активністю;
- Неодмінна складова у контролі вірусу пташиного грипу.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

1. Механічне очищення.
2. Первинне змивання водою.
3. Миючі засоби (ФОМКЛІН/АВІКЛІН 0,8–1,5 % – основне миття 5–30 хв).
4. Дуже ретельне промивання чистою водою.
5. Висушування (рекомендується).
6. Дезінфекція (Артіцид 1,0–3,0 % за інструкцією).
7. Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT з повною ротацією препаратів

LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) ВАРІАНТ 1 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ БЮБЕЗПЕКИ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТІЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30 хв
ГОДІВЛЯ	ЛІАЦИД 1 мл/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2 БЮБЕЗПЕКА - ОСНОВА ЗДОРОВ'Я ПТИЦІ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ.	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТІЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води

ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками.

Невикористаний засіб до наступного проведення дезінфекції зберігають у щільно закритій тарі у місцях, недоступних для дітей і тварин.

У разі перевищення терміну зберігання концентрату або накопичення відпрацьованих об'ємів розчину їх треба розбавити питною водою до безпечної концентрації (0,01%), змити в каналізацію або засипати негорючим адсорбентом (пісок, земля тощо) та вивезти на полігон знешкодження.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АЕРОЗОЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Ретельна підготовка приміщень (ліквідація протягів).
- Максимальне очищення поверхні, що підлягає дезінфекції, із застосуванням детергентів.
- Дотримання температурного режиму повітря та поверхні: мінімальна - 12°C; оптимальна – 18-22; максимальна - 25°C.
- Оптимальна вологість повітря в приміщенні має становити 50 % і більше.
- Контроль дисперсності аерозолей.
- Розпилення аерозолей необхідно проводити з кількох місць приміщення.
- Підбір дезінфікуючих засобів залежно від чутливості мікроорганізмів.

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення – зрошенням або піноутворювачем: забезпечує контакт з вертикальними поверхнями.
- Після експозиції обов'язково провітрити приміщення та промити водою поверхні, що контактують з кормами/водою.
- Не змішувати з милами, аніонними ПАР, хлором, окисниками – застосовувати послідовно з промивкою між етапами.
- При аерозольній обробці з'являється гострий запах – після експозиції провітрити.
- Зберігати в тарі виробника при 5–20°C, термін придатності 2 роки.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.

Тел.: +38 097 420 9999

Email: sanfortp@gmail.com