

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

AVICLEAN

ЗАСІБ МИЮЧИЙ КИСЛОТНИЙ

характеризується високою мийною активністю щодо мінеральних відкладень, білкових та жирових забруднень. Завдяки активній формулі забезпечує ефективне очищення та гігієнічну обробку поверхонь

Склад

ОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ	30-35 %
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (А-ПАР)	5,0-10,0 %
ЧЕТВЕРТИННІ АМОНІЙНІ СПОЛУКИ	3.0-5.0 %

Показання до застосування.

Застосовується для миття та гігієнічної обробки обладнання, інвентарю, поверхонь виробничих та тваринницьких приміщень на об'єктах агропромислового комплексу, ветпунктах, лабораторіях, клініках і аптеках ветеринарної медицини, а також на інших об'єктах, що підлягають ветеринарному нагляду.

Інструкції із застосування.

Миття та гігієнічну обробку проводять після ретельної механічної очистки поверхонь (видалення грубих залишків посліду, підстилки, пір'я, корму, пилу тощо). AVICLEAN застосовують на етапі первинної мийки для видалення мінеральних відкладень, білкових та жирових забруднень, підготовки поверхонь до подальшої дезінфекції.

Дезінфекцію проводять після повного промивання та висихання поверхонь.

- Очищення обладнання та інвентарю – використовується робочий розчин у концентрації 0,5-1,5%, залежно від ступеня забруднення.
- Нанесення – вручну, за допомогою піногенераторів або апаратів низького/високого тиску.
- Підготовка поверхні – для підвищення ефективності попередньо змочити водою.
- Експозиція – залишити на поверхні на 15-30 хвилин.
- Змивання – ретельно змити великою кількістю води.
- Контроль нанесення – завдяки індикаторному зеленому кольору.

Таблиця приготування робочих розчинів

Концентрація розчину (%) за препаратом	Кількість інгредієнтів (мл) для 1 л		Кількість інгредієнтів (мл) для 10 л	
	Авіклін	Вода	Авіклін	Вода
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
0,8	8,0	992,0	80,0	9920,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0

Рекомендовані концентрації залежно від ступеня забруднення.

- Легке забруднення (майже чисті поверхні після хорошого механічного очищення) → 0,5–0,8 %
- Середнє забруднення (типове пташникове/індичинне виробництво) → 0,8–1,5 %
- Сильне забруднення (стара накип, багато білка, жиру, мінеральних відкладень) → 1,0–1,5 % (у важких випадках навіть до 2 %)

Рекомендовані концентрації та параметри застосування Авіклін

№ етапу	Назва етапу	Концентрація робочого розчину	Норма витрати	Експозиція	Спосіб нанесення	Примітки / наступний етап
1	Первинне попереднє миття (грубе)	0,5 – 1,0 %	200–400 мл/м ²	5–15 хв	піногенератор / АВД низького тиску / вручну	бажано дуже добре змити брудну піну водою

№ етапу	Назва етапу	Концентрація робочого розчину	Норма витрати	Експозиція	Спосіб нанесення	Примітки / наступний етап
2	Основне кислотне миття + видалення мінеральних та білково-жирових відкладень	0,5 – 1,5 %	250–500 мл/м²	15–30 хв	піногенератор (дуже добре тримає піну), АВД, вручну	найважливіший етап – забезпечує чистоту перед дезінфекцією
3	Заключне промивання	—	велика кількість води	—	АВД високого тиску / шланг	обов'язково повністю змити всі залишки кислоти
4	Дезінфекція (після повного висихання)	згідно з інструкцією препарату дезінфектанту	згідно інструкції	згідно інструкції	згідно інструкції препарату	Йодосан, Артіцид, Крезодез та ін.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Механічне очищення.
- Первинне змивання водою.
- AVICLEAN 0,8–1,5 %** – основне кислотне миття → 15–30 хв.
- Дуже ретельне промивання чистою водою.
- Висушування (бажано).
- Дезінфекція (ЙОДАСАН / АРТІЦИД / інший препарат за інструкцією).
- Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS, (ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ/ІНДИЧОК)	
ПЕРВИННА МИЙКА	AVICLEAN 1–3 % (або ФОМКЛІН) + механічне очищення.
ОЧИЩЕННЯ ТА ПРОМИВКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	AVICLEAN 1–2 % або ФОМКЛІН
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТІЦИД 1,2 % (антибактеріальна + антивірусна)
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 % (аерозоль 2–4 мл/м³)
ГОДІВЛЯ / ПРОФІЛАКТИКА	ЛІАЦИД через воду/корм
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 % на випійку 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО/НЕСУЧКИ)	
ПЕРВИННА МИЙКА	AVICLEAN 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

До роботи допускаються особи не молодше 18 років. Роботи проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). За умови недотримання застережних заходів при попаданні засобу на шкіру і в очі можливі місцеві подразнювальні реакції. При появі ознак подразнення припинити роботу, вивести на свіже повітря. При потрапленні в очі промити проточною водою протягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря. При потрапленні на шкіру промити водою та змастити кремом. При потрапленні в шлунок випити воду з активованим вугіллям та звернутись до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити обличчя і руки з милом.

ПЕРЕВАГИ

- Утворює стабільну піну, яка забезпечує тривалу дію на вертикальних та важкодоступних поверхнях.
- Легко справляється з мінеральними відкладеннями, білковими та жировими забрудненнями.
- Сумісний з різними системами нанесення – ручними, піногенераторами, апаратами низького та високого тиску.
- Має індикаторний зелений колір для контролю нанесення

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення – **піногенератором**: стабільна густа піна тримається на вертикальних поверхнях та важкодоступних місцях.
- Зелений індикаторний колір дозволяє візуально контролювати рівномірність покриття та місця пропусків.
- Після експозиції обов'язково ретельно промити великою кількістю води (АВД високого тиску або шланг), щоб повністю видалити залишки кислоти – інакше вони можуть знижувати ефективність подальшої дезінфекції (Артіцид, Йодасан тощо) або викликати корозію.
- Препарат зберігає активність у жорсткій воді, при низьких температурах (від +5 °C), у присутності залишків органіки (але максимальна ефективність – після механічного очищення).
- Не змішувати з лужними засобами (наприклад, Фомклін) в одній ємності – застосовувати послідовно з промивкою між етапами.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.

Тел.: +38 097 420 9999

Email: sanfortp@gmail.com

