

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

ЙОДАСАН (IODASAN)

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

(РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ АВ-00000-00-00 ВІД 01.10.20__ Р.)

широкого спектру дії, який характеризується високою протимікробною, віруліцидною та фунгіцидною активністю і зберігає ефективність у присутності органічних матеріалів.



Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

йод	3,0 %
-----	-------

Допоміжні речовини: ортофосфатна кислота, етоксильовані спирти, вода.

Фармакологічні властивості.

Засіб має активну протимікробну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus faecium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *E. coli*, *M. bovis*, *M. fortuitum*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp. та інші), проявляє віруліцидну дію на ДНК- та РНК-вмісні віруси (*Newcastle disease virus*, *Teschovirus*, *Porcine circovirus type 2*, *Classical swine fever virus*, *Porcine reproductive and respiratory syndrome virus*, *Aujeszky's disease virus*, *Parvovirus disease* та інші), фунгіцидні властивості (включаючи *Candida* spp., *Aspergillus* spp. та інші).

Показання до застосування.

Засіб застосовують для профілактичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекції усіх видів тваринницьких і птахівничих приміщень, інкубаторіїв, систем подачі питної води, забійних і м'ясопереробних цехів, транспортних засобів, дезбар'єрів, обладнання, інвентарю, інкубаційних яєць, а також для санації дихальних шляхів тварин і птиці, обробки вим'я лактуючих свиноматок і дійних корів після доїння та інших об'єктів, що підлягають ветеринарному нагляду.

Дози і способи застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь. Робочі розчини готують шляхом додавання відповідної кількості препарату до водопровідної води. Дезінфекцію проводять методами протирання, зрошення, піноутворення та аерозольного розпилення (туманоутворення).

Таблиця приготування робочих розчинів

Концентрація робочого розчину по препарату, %	Кількість інгредієнтів (мл) для готування робочого розчину			
	об'ємом 1 літр		об'ємом 10 літрів	
	Йодасан, мл	Вода, мл	Йодасан, мл	Вода, мл
0,3	3	997	30	9970
0,5	5	995	50	9950
0,75	7.5	992,5	75	9925
1,0	10	990	100	9900
2,0	20	980	200	9800
50	500	500	5000	5000

Основні режими застосування.

Аерозольна (газова) дезінфекція. Для аерозольної дезінфекції приміщень перед введенням тварин та птиці із застосуванням генератору туману використовують 50 %-й водний розчин Йодасан з витратою робочого розчину 2,0 - 4,0 мл/м³ (дозування препарату з розрахунку кількості йоду 50-100 мг/м³ приміщення). Обробку проводять одноразово, експозиція становить 30 хвилин. Після експозиції ретельно провітрюють приміщення.

Профілактика захворювань, що передаються повітряним шляхом доза йоду 10 мг/м³ (50 % розчин, 0,4 мл/м³), експозиція 30 хв (2-3 цикли по 8-10 обробок).

Лікування захворювань, що передаються повітряним шляхом – доза йоду 20 мг/м³ (50 % розчин, 0,8 мл/м³), експозиція 30 хв (до 10 обробок у 3–4 цикли).

Профілактична волога дезінфекція.

Бактеріальні інфекції – 0,3 % розчин, 0,3 л/м², експозиція 30 хв.

Грибкові інфекції – 0,5 % розчин, 250–300 мл/м², експозиція 60 хв.

Вірусні інфекції – 0,5 % розчин, 200–400 мл/м², експозиція 30 хв.

Дезінфекція настилу, транзитних ванн, інструментів – 0,5 % розчин, експозиція 60 хв.

Система питної води – 0,5 % розчин (заповнення на 30 хв), потім промивання; для питної води – 0,04 % (1:2500).



Вимушена/заклучна дезінфекція.

Бактеріальні інфекції – 0,3–0,5 % розчин, 250–300 мл/м², експозиція 60 хв.

Грибкові інфекції – 0,75–1,0 % розчин, 300–400 мл/м², експозиція 60 хв.

Вірусні інфекції – 0,5 % розчин, 200–400 мл/м², експозиція 60 хв.

Обробка інкубаційних яєць – 1–2 % розчин (занурення або спрей, 1–2 мл на яйце) або 50 % розчин в газовій камері (2 мл/м³, 30 хв).

Рекомендовані концентрації залежно від типу інфекції

Бактеріальні інфекції	0,3–0,5 %
Вірусні інфекції	0,5 %
Грибкові інфекції	0,75–1,0 %
Аерозольна профілактика/лікування	50 %
Обробка яєць / інструментів	0,5–2,0 %

Спеціальні застереження.

Не застосовувати аерозольно за одну добу до, в день і дві доби після вакцинації. Не змішувати з альдегідними деззасобами та лужними миючими засобами.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

До роботи не допускаються особи молодше 18 років. Використовувати захисні окуляри, універсальний респіратор (РУ-60 або РПГ-67 з патроном В), рукавиці з ПВХ. При потраплянні в очі – промити 2 % розчином тіосульфату натрію + велика кількість води, закапати 33 % сульфацил натрію (при болях – 1–2 % новокаїн). При потраплянні на шкіру – промити 2 % розчином тіосульфату натрію, потім водою. При потраплянні в шлунок – випити 200 мл 2 % розчину тіосульфату натрію + велика кількість води, викликати блювоту, звернутися до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити руки та обличчя з милом.

Форми несумісності

Не сумісний з альдегідними дезінфектантами, лугами, милами, окисниками.

Особливі заходи зберігання

Зберігати в тарі виробника при температурі від 5°C до 25°C у сухих, темних, вентильованих приміщеннях, захищених від прямого сонячного проміння. Термін придатності – 3 роки.

Форма випуску.

Каністри з поліетилену місткістю 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 5; 10; 20 кг, скляні флакони по 0,05; 0,1 кг.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом.

Невикористаний засіб зберігати в щільно закритій тарі. Залишки розбавити водою до 0,01 % і змити в каналізацію або засипати адсорбентом і вивезти на полігон.

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ЙОДАСАН»

- Висока активність проти широкого спектру бактерій, вірусів і грибів.
- Зберігає ефективність у присутності органіки та жорсткій воді.
- Можливість застосування при низьких температурах (до –20 °C з антифризом).
- Ефективний для аерозольної дезінфекції та санації дихальних шляхів.
- Неодмінний компонент у схемах біобезпеки птахівництва та тваринництва.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Механічне очищення.
- Первинне змивання водою.
- Миючі засоби (ФОМКЛІН / АВІКЛІН 0,8–1,5 % → 15–30 хв).

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Ретельне промивання чистою водою.
- Висушування (рекомендується).
- Дезінфекція (ЙОДАСАН 0,3–1,0 % або 50 % аерозоль).
- Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT з повною ротацією препаратів

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) ВАРІАНТ 1 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ БІОБЕЗПЕКИ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТИЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30 хв
ГОДІВЛЯ	ЛІАЦИД 1 мл/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2 БІОБЕЗПЕКА - ОСНОВА ЗДОРОВ'Я ПТИЦІ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ/ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення – піноутворювачем або генератором туману.
- Після аерозольної обробки обов'язково провітрити приміщення.
- Контроль якості вологого розчину – за характерним бурштиново-коричневим кольором.
- Зберігати при 5–25 °С, термін придатності 3 роки.
- Йодасан зберігає свою активність при інтенсивному освітленні, при використанні жорсткої води, в присутності органічних матеріалів (гній, сеча, залишки корму тощо) і діє в широкому діапазоні температур (від 0 до 50 °С). При температурі нижче 0 °С рекомендується додавання антифризу (пропіленгліколь).
- Аерозольна дезінфекція:** перед обробкою приміщення герметизують (щільно зачиняють вікна, двері, вентиляційні люки) і вимикають вентиляцію. Для обробки засобом застосовують генератори туману, інші технічні засоби для розпилення або ж безапаратні методи, важливо, щоб було забезпечено утворення стійкого туману з ефективним розміром часток 0,5 – 20,0 мкм, причому чим менша дисперсність аерозолі, тим більша ефективність дезінфекції.
- Технологія обробки повинна передбачати якомога швидке і рівномірне розповсюдження аерозолі по всьому приміщенню. При використанні генераторів туману порядок розпилення визначають з урахуванням технічних параметрів генератору, при безапаратних методах розпилення треба використовувати інструкції до відповідних безапаратних методів, при цьому для безапаратного розпилення бажано, щоб на кожну точку розпилення припадало 500 м³ приміщення.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
Тел.: +38 097 420 9999
Email: sanfortp@gmail.com

