

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

КРЕЗОДЕЗ (KREZODEZ)

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ

(РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ АВ-09494-03-21)

Органічний препарат широкого спектру дії, який активний до всіх збудників інфекційних хвороб та з антипротозойними властивостями



Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

МЕТАКРЕЗОЛ	19,2 %
НАТРІЙ ГІДРОКСИД	20,0 %

Допоміжні речовини: ортокрезол, вода.

Фармакологічні властивості.

Препарат має активну бактерицидну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus faecalis*, *Enterobacter aerogenes*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium perfringens*), фунгіцидну дію (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*), віруліцидну дію до хвороби Ньюкасла (Newcastle disease virus), хвороби Аujeszкі (Aujeszky's disease virus), хвороби Тешена (Teschovirus), парвовірусної інфекції свиней (Parvovirus disease) та антипротозойну дію (*Eimeria* spp.).

Показання до застосування.

Засіб застосовують для профілактичної, вимушеної (поточної та заключної) дезінфекції усіх видів тваринницьких і птахівничих приміщень, транспортних засобів, дезбар'єрів, обладнання та інших об'єктів, що підлягають ветеринарному нагляду, а також для дезінвазії приміщень при протозойних захворюваннях (кокцидіоз).

Дози і способи застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь. Робочі розчини готують шляхом додавання відповідної кількості препарату до водопровідної води.

Дезінфекцію проводять методом зрошення та протирання.

Концентрація робочого розчину по препарату, %	Кількість препарату/води, л			
	На 10 л розчину (препарат / вода, л)		На 100 л розчину (препарат / вода, л)	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
2,0	0,2	9,8	2,0	98,0
4,0	0,4	9,6	4,0	96,0

Основні режими застосування.

Профілактична дезінфекція - 0,5–1,0 % розчин, 0,25–0,3 л/м², експозиція 1–3 години.

Вимушена/заклучна при бактеріальних інфекціях (крім туберкульозу) - 1,0–1,5 % розчин, 0,3–0,5 л/м², експозиція 3 години.

При грибкових захворюваннях - 2,0 % розчин, 0,3–0,5 л/м², експозиція 3 години.

Дезінвазія при протозойних захворюваннях (*Eimeria* spp.) - 4,0 % розчин, 0,3–0,5 л/м², експозиція 6 годин.

Заправка дезбар'єрів і дезкилимків - 0,5–1,0 % розчин (заміна 1 раз на тиждень або при забрудненні).

Після експозиції місця можливого накопичення залишків (голівниці, поїлки) промити водою.

Рекомендовані концентрації залежно від типу інфекції

Бактеріальні інфекції	1,0–1,5 %
Грибкові інфекції	2,0 %
Протозойні інфекції (кокцидіоз)	4,0 %
Профілактика / дезбар'єри	0,5–1,0 %

Спеціальні застереження.

Не застосовувати в присутності тварин і птиці. При використанні препарату з'являється гострий неприємний запах — після обробки приміщення обов'язково провітрити. Не застосовувати одночасно з іншими дезінфікуючими засобами. Антимікробна активність зменшується при наявності неіонних ПАР.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

До роботи не допускаються особи молодше 18 років. Дезінфекцію методом зрошення проводити в спецодязі, універсальному респіраторі, захисних окулярах, гумових рукавицях. Приготування розчинів у провітрюваному приміщенні. При попаданні в очі - промити проточною водою 10–15 хв і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - промити водою і змастити кремом. При попаданні в шлунок - випити кілька склянок води з 10–20 таблетками активованого вугілля і звернутися до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити руки та обличчя з милом.

Форми несумісності.

Не сумісний з іншими дезінфікуючими засобами, неіонними ПАР.

Особливі заходи зберігання.

Зберігати в тарі виробника при температурі від 8 °С до 20 °С у сухих, темних, вентильованих приміщеннях, захищених від прямого сонячного проміння. Термін придатності - 2 роки.

Форма випуску.

Флакони та каністри з полімерних матеріалів місткістю 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, діжки по 200 л.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом.

Невикористаний засіб зберігати в щільно закритій тарі. Залишки розбавити водою до безпечної концентрації та змити в каналізацію або засипати адсорбентом і вивезти на полігон.

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «КРЕЗОДЕЗ»

- Потужна бактерицидна, фунгіцидна, віруліцидна та антипротозойна дія (включаючи Eimeria spp.).
- Ефективний проти кокцидій та яєць комах.
- Застосовується для всіх типів поверхонь.
- Висока стійкість до органічних забруднень.
- Неодмінний компонент первинної дезінфекції в схемах біобезпеки птахівництва та тваринництва.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Механічне очищення.
- Первинне змивання водою.
- Миючі засоби (ФОМКЛІН / АВІКЛІН 0,8–1,5 % → 15–30 хв).
- Ретельне промивання чистою водою.
- Висушування (рекомендується).
- Дезінфекція (КРЕЗОДЕЗ 1,0–4,0 % за інструкцією).
- Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT з повною ротацією препаратів

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) ВАРІАНТ 1 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ БІОБЕЗПЕКИ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТИЦИД 1,2 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 30 хв
ГОДІВЛЯ	ЛІАЦИД 1 мл/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2 БІОБЕЗПЕКА - ОСНОВА ЗДОРОВ'Я ПТИЦІ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ (РУЙНАЦІЯ ЯЄЦЬ КОМАХ ТА КОКЦИДІЙ)	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–2,25 %, 0,3–0,5 л/м², 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ/ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення - зрошенням.
- Після експозиції обов'язково провітрити приміщення.
- Місця контакту з кормами/водою промити водою.
- Зберігати при 8–20 °С, термін придатності 2 роки.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
Тел.: +38 097 420 9999
Email: sanfortp@gmail.com

