

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

ЛОКСАН АТЕ (LOXAN ATE)

АНТИОКСИДАНТ

(ТУ У 10.9-38336495-005:2025)

потрійна антиоксидантна формула для запобігання окисленню жирів і вітамінів у кормах, збереження поживної цінності та якості сировини.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

БУТИЛГІДРОКСИТОЛУОЛ	15,5 %
БУТИЛГІДРОКСІАНИЗОЛ	5,5 %
ТОКОФЕРОЛ	1,0 %

Фармакологічні властивості.

Антиоксидантна активність **ЛОКСАН АТЕ** базується на безпосередній взаємодії з вільними радикалами шляхом забезпечення їх електронами або воднем. Потрійний склад композиції забезпечує потужну антиоксидантну дію, запобігаючи окисленню жирів і вітамінів у кормах. Бутилгідрокситолуол є синтетичним аналогом вітаміну Е (токоферолом) - гарантує стабільність і тривалий захисний ефект продукту. Виражений синергізм антиоксидантної дії досягається завдяки унікально підібраній пропорції компонентів. Забезпечує стабільність якості кормів при зберіганні навіть у складних умовах (підвищена температура, вологість).

Показання до застосування

Профілактика можливих кормових інтоксикацій, спричинених окисленням жирів і жиророзчинних вітамінів. Для збереження енергетичної цінності та безпечності сировини у раціоні. Для стабілізації якості м'ясо-кісткового та рибного борошна, готових комбікормів і білкових добавок.

Для продовження терміну зберігання кормів і запобігання розвитку неприємного запаху через прогоркання жирів.

Не втрачає активності після термічної обробки.

Інструкції із застосування.

Додається безпосередньо в кормові суміші або до жирової фази під час виробництва комбікормів.

- Дозування: 100–300 г на 1 т корму – для профілактики окислення; 300–600 г на 1 т корму – при підвищеній вологості або тривалому зберіганні.
- Метод внесення: рівномірно розподілити по всій масі корму або жирового компонента при ретельному перемішуванні.
- Експозиція: не потребує, продукт діє безпосередньо після внесення.

Рекомендовані концентрації залежно від типу корму/умови

Профілактика окислення (стандартні умови)	100–300 г/т корму
Підвищена вологість / тривале зберігання	300–600 г/т корму
Для м'ясо-кісткового борошна / рибного борошна	200–400 г/т
Для комбікормів з високим вмістом жирів	300–500 г/т
Для білкових добавок / преміксів	100–200 г/т

ПЕРЕВАГИ

- Антиоксидантна активність базується на безпосередній взаємодії з вільними радикалами шляхом забезпечення їх електронами або воднем;
- Потрійний склад композиції забезпечує потужну антиоксидантну дію, запобігаючи окисленню жирів і вітамінів у кормах;
- Бутилгідрокситолуол є синтетичним аналогом вітаміну Е (токоферолом) - гарантує стабільність і тривалий захисний ефект продукту;
- Виражений синергізм антиоксидантної дії досягається завдяки унікально підібраній пропорції компонентів;
- Забезпечує стабільність якості кормів при зберіганні навіть у складних умовах (підвищена температура, вологість).

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготовка сировини (жири, борошно, премікси).
2. Внесення ЛОКСАН АТЕ 100–300 г/т – профілактичне змішування.
3. Змішування з основним кормом – рівномірне розподілення.
4. Годівля тварин/птиці – постійне використання в раціоні.
5. Моніторинг якості кормів – перевірка на запах прогорклості.
6. Збільшення дози при стресі (волгість, температура) – до 300–600 г/т.
7. Завершення курсу – поступове зниження дози при стабільній якості.

СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОКСАН АТЕ

ПОРОСЯТА	
Старт/відлучені	100–300 г/т корму
Дорощення і фініш	200–400 г/т корму
СВИНОМАТКИ	
Супоросні до 80 діб	100–200 г/т корму
Супоросні від 80 діб і підсисні	200–300 г/т корму
Свині на відгодівлі	200–400 г/т корму
ПТИЦЯ	
БРОЙЛЕРИ	
Старт	100–300 г/т корму
Вирощування	200–400 г/т корму
Фініш	300–500 г/т корму
НЕСУЧКИ І ПЛЕМСТАДО	
Старт до 1 місяця	100–300 г/т корму
Молодняк на вирощуванні	200–400 г/т корму
Кладка і пік до 25-ти тижневого віку	300–500 г/т корму
Продуктивний період	200–400 г/т корму
Завершальний період (від 40-го тижня)	200–400 г/т корму
КОМБІКОРМИ/БІЛКОВІ ДОБАВКИ/БОРОШНО	200–500 г/т (залежно від жирності та умов зберігання)

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше застосування – рівномірне змішування з кормом або дозування в воду.
- Після відкриття упаковки використовувати протягом 1 місяця.
- Контроль рН – для води оптимально 4,0–4,5, для корму 5,0–6,0.
- Зберігати при 5–20 °С, термін придатності 12 місяців.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com