

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

НЕОСЕНС (NEOSENS)

ПІДКИСЛЮВАЧ КОРМІВ ТА ВОДИ
(ТУ У 10.9-38336495-033:2024))

висококонцентрована суміш органічних кислот та корисних складників для захисту тварин від патогенних мікроорганізмів та покращення травлення.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

МУРАШИНА КИСЛОТА (E236)	32,0 %
МОЛОЧНА КИСЛОТА (E270)	17,0 %
ПРОПІОНОВА КИСЛОТА (E280)	9,0 %
ОЦТОВА КИСЛОТА (E260)	4,5 %
ЛИМОННА КИСЛОТА (E330)	2,5 %
МАСЛЯНА КИСЛОТА (ТРИБУТИРИН)	1,0 %
СЕРЕДНЬОЛАНЦЮГОВІ ЖИРНІ КИСЛОТИ (C8, C10)	0,5 %
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА (ВІТАМІН С, E300)	0,2 %
РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ	0,2 %
СУРФАКТАНТИ ТА СТАБІЛІЗАТОРИ	2,0 %
ГЛІЦЕРИЛ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬРИЦИНООЛЕАТ	2,0 %
ВОДА	до 100,0 %

Фармакологічні властивості.

«НЕОСЕНС» - це висококонцентрована суміш органічних кислот C1-C3 (мурашина, молочна, пропіонова, оцтова, лимонна), яка включає також середньоланцюгові жирні кислоти C8-C10, масляну кислоту (трибутирин), аскорбінову кислоту, рослинні екстракти, гліцерил поліетиленглікольрициноолеат та ряд інших корисних складників, що додають до корму та води з метою захисту тварин від патогенних мікроорганізмів (*E.coli*, *Salmonella*, *Campylobacter*, *Pseudomonas*) та плісневих грибів, покращення споживання корму, підвищення засвоюваності білків та створення сприятливих умов для росту корисної мікрофлори в кишечнику.

Органічні кислоти C1-C3 володіють достатньо високою бактерицидною активністю, відносно безпечні у використанні, добре змішуються з кормом і практично не взаємодіють з його компонентами (вітамінами, білками). Їх застосування не викликає побічних ефектів і ускладнень. Вони діють на хвороботворні мікроорганізми шляхом зниження рН субстрату, змінюючи в результаті кислотно-основний баланс у клітині патогену. В результаті зниження рН корму та питної води знижується буферна ємність лужних компонентів корму (крейди, вапняку, трикальційфосфату), покращується використання азоту, кальцію і фосфору в організмі тварин та птиці.

Після годування з використанням підкислювачів у шлунку знижується кислотність, неактивний основний фермент шлунку пепсиноген, відповідальний за перетравлення білків, перетворюється на активний пепсин.

Рослинні компоненти, масляна кислота (утворюється внаслідок гідролізу трибутирину), середньоланцюгові жирні кислоти підвищують секрецію травних ферментів, апетит та споживання корму, засвоюваність кормів, покращують мікрофлору шлунково-кишкового тракту (зменшують проноси).

Показання до застосування.

Збереження поживних властивостей кормової сировини. Фізіологічне підкислення кормів і води. Профілактика і лікування розладів травлення.

Дози і способи застосування.

Підкислення води та корму проводять за допомогою додавання продукту «НЕОСЕНС» до води або корму у відповідній кількості.

Дози і способи введення тваринам різного віку

ПІДКИСЛЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ	0,3-1,0 л/т води
ПІДКИСЛЕННЯ КОРМІВ	
БРОЙЛЕРИ	
Старт	2-4 л/т корму
Вирощування	1,5-2 л/т корму
Фініш	2-3 л/т корму
НЕСУЧКИ І ПЛЕМСТАДО	
Старт до 1 місяця	2-4 л/т корму
Молодняк на вирощуванні	1,5-2 л/т корму
Кладка і пік до 25 тижневого віку	2-3 л/т корму
Продуктивний період	2-3 л/т корму
Завершальний період (від 40 тижня)	2-3 л/т корму
ПОРОСЯТА	
Старт	1-4 л/т корму
Відлучені	2-4 л/т корму
Дорощення і фініш	1-4 л/т корму
СВИНОМАТКИ	
Супоросні до 80 діб	0,5-1,5 л/т корму
Супоросні від 80 діб і підсисні	1,5-2 л/т корму
СВИНІ НА ВІДГОДІВЛІ	1-3 л/т корму

Спеціальні застереження.

Висококонцентрована суміш. Зберігати препарат у щільно закритій упаковці, відкривати обережно.

Використання під час вагітності і лактації: без обмежень.

Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії: немає

Особливі застереження при використанні

шкідливо для здоров'я при вдиханні та попаданні на шкіру. Уникати потрапляння на шкіру, в очі та на одяг. Не вдихати пари. При роботі використовувати захисний одяг, маску, рукавиці та захисні окуляри. Забороняється палити, пити, приймати їжу під час роботи. Після роботи з продуктом добре вимити руки водою.

Особливі заходи зберігання.

Зберігати в тарі виробника при температурі від 5°C до 20°C у сухих, темних, вентильованих приміщеннях, захищених від прямого сонячного проміння. Термін придатності - 12 місяців.

Форма випуску.

Пластмасові (HDPE) каністри, бочки або контейнери по 1, 5, 10, 25, 200 та 1000 л.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом

Невикористаний засіб зберігати в щільно закритій тарі. Залишки розбавити водою та змити в каналізацію або засипати адсорбентом і вивезти на полігон.

ПЕРЕВАГИ

- Широка протимікробна дія завдяки синергізму органічних кислот з ефірними маслами.
- Покращення споживання корму, засвоюваності білків та росту корисної мікрофлори.
- Зниження буферної ємності корму, покращення використання азоту, кальцію та фосфору.
- Профілактика розладів травлення та захист від патогенів (E.coli, Salmonella тощо).
- Безпечний для використання, не взаємодіє з компонентами корму.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підкислення питної води – 0,3–1,0 л/т води (постійно або курсами).
2. Підкислення кормів – залежно від виду тварин (див. таблицю).
3. Профілактика розладів – підвищені дози при стресі (відлучення, транспортування).
4. Лікування розладів – максимальні дози (2–4 л/т корму) до нормалізації стану.
5. Комбінація з іншими добавками – для посилення ефекту (пробіотики, ферменти).
6. Моніторинг – контроль pH корму/води (оптимально 4,0–5,5).
7. Завершення курсу – поступове зниження дози.

СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В ГОДІВЛІ ЗАСОБАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) ВАРІАНТ 1	
Старт	2–4 л/т корму
Вирощування	1,5–2 л/т корму
Фініш	2–3 л/т корму
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2	
Старт до 1 місяця	2–4 л/т корму
Молодняк на вирощуванні	1,5–2 л/т корму
Кладка і пік до 25-ти тижневого віку	2–3 л/т корму
Продуктивний період	2–3 л/т корму
Завершальний період (від 40-го тижня)	2–3 л/т корму
СВИНИ ВАРІАНТ	
Поросята старт / відлучені	1–4 л/т корму
Дорощення і фініш	1–4 л/т корму
Свиноматки супоросні до 80 діб	5–1,5 л/т корму
Супоросні від 80 діб і підсисні	1,5–2 л/т корму
Свині на відгодівлі	1–3 л/т корму

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше застосування – рівномірне змішування з кормом або дозування в воду.
- Після відкриття упаковки використовувати протягом 1 місяця.
- Контроль pH – для води оптимально 4,0–4,5, для корму 5,0–6,0.
- Зберігати при 5–20 °C, термін придатності 12 місяців.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com

