

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

PALEODEZ

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ НИЗЬКОПІННИЙ

на основі надोцтової кислоти характеризується потужною антимікробною дією проти бактерій, вірусів, грибів та спор. Завдяки активній формулі забезпечує ефективну дезінфекцію та стерилізацію поверхонь і обладнання.



Склад

НАДОЦТОВА КИСЛОТА	25,0-30,0 %
ПЕРЕКИС ВОДНЮ	20,0-25,0 %

Показання до застосування.

Застосовується для обробки поверхонь з хромнікелевої(нержавіючої) сталі, алюмінію, латуні, міді, пластмас, скла, емалі, а також виробів з гуми.

Основні режими застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної очистки поверхонь (видалення грубих залишків посліду, підстилки, пір'я, корму, пилу тощо). **PALEODEZ** застосовують для очищення ліній поїння, циркуляції в СІР системах, ополіскування та занурення.

- Очищення ліній поїння - використання робочого розчину 1,0 -2,0 %;
- Циркуляція в СІР системі, ополіскування та занурення концентрація робочого розчину 0,05 - 0,2 %, за температури 5-60°C;
- Для обробки тушки у ванні - використовується при концентрації 0,01 - 0,05 %;
- Після дезінфекції засобом ополіскування не проводиться. Не використовувати обладнання з харчовими продуктами до моменту повного розпаду препарату;
- При температурі до 40°C ефективність засобу збільшується, таким чином, можливе зменшення часу експозиції.

Таблиця приготування робочих розчинів

Концентрація розчину (%) за препаратом	Кількість інгредієнтів (мл) для 1 л		Кількість інгредієнтів (мл) для 10 л	
	Палеодез	Вода	Палеодез	Вода
0,01	0,1	999	1,0	9999,0
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0

Рекомендовані концентрації залежно від типу обробки

Постійна стерилізація питної води	0,01–0,05 %
Циркуляція в СІР системі, ополіскування, занурення	0,05–0,2 %
Очищення ліній поїння	1,0–2,0 %

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Механічне очищення.
- Первинне змивання водою.
- Миючі засоби (ФОМКЛІН / AVICLEAN 0,8–1,5 % – основне миття → 15–30 хв).
- Дуже ретельне промивання чистою водою.
- Висушування (бажано).
- Дезінфекція (**PALEODEZ** 0,05–2,0 % за інструкцією).
- Заключне провітрювання / висушування

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ БІОБЕЗПЕКИ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 % (або ERSTEDEZ) + механічне очищення.
ОЧИЩЕННЯ ТА ПРОМИВКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	PALEODEZ 0,05–0,2 % (циркуляція 12 год)
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТИЦИД 1,2 % (антибактеріальна + антивірусна)
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 % (аерозоль 2–4 мл/м³)
ГОДІВЛЯ / ПРОФІЛАКТИКА	ЛІАЦИД через воду/корм
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 % на випійку 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2 БІОБЕЗПЕКА - ОСНОВА ЗДОРОВ'Я ПТИЦІ	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	PALEODEZ 0,05–0,2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ/ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

До роботи допускаються особи не молодше 18 років. Роботи проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). За умови недотримання застережних заходів при попаданні засобу на шкіру і в очі можливі місцеві подразнювальні реакції. При появі ознак подразнення припинити роботу, вивести на свіже повітря. При потрапленні в очі промити проточною водою протягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря. При потрапленні на шкіру промити водою та змастити кремом. При потрапленні в шлунок випити воду з активованим вугіллем та звернутись до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити обличчя і руки з милом.

ПЕРЕВАГИ

- Має потужну антимікробну дію проти бактерій, вірусів, грибів та спор.
- Стабільна формула завдяки збалансованому вмісту надоцтової кислоти та перекису водню.
- Не залишає токсичних залишків, швидко розкладається на безпечні компоненти (оцтову кислоту, воду, кисень).
- Може замінити традиційні дезінфектанти (хлорвмісні, ЧАС), зменшуючи ризик резистентності мікроорганізмів.
- Сумісний із більшістю матеріалів (нержавіюча сталь, алюміній, пластмаси, гума, скло, емаль, латунь, мідь).
- Підходить для CIP-мийки (clean-in-place).

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення – зрошенням або піноутворювачем: забезпечує контакт з вертикальними поверхнями.
- Після експозиції не потрібно ополіскувати, але не використовувати обладнання з харчовими продуктами до повного розпаду препарату.
- Препарат діє в широкому діапазоні температур (5–60 °C), у твердій воді, при залишках органіки.
- Не сумісний з лужними засобами в одній ємності – застосовувати послідовно з промивкою між етапами.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
Тел.: +38 097 420 9999
Email: sanfortp@gmail.com