

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

САНФОРТ-ДЕЗ (SANFORT-DEZ)

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

(РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ АВ-04559-03-13 ВІД 07.09.2023 Р.)

широкого спектру дії, який активний до всіх збудників інфекційних хвороб та характеризується мийними властивостями.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

ГЛУТАРОВИЙ АЛЬДЕГІД	17,4 г
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНІУ ХЛОРИД	6,4 г
ФОРМАЛЬДЕГІД	17,2 г

Фармакологічні властивості.

Препарат має активну бактерицидну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus hirae* та інші), фунгіцидну дію (*Candida albicans*, *Aspergillus flavus* та інші), спороцидну (мікроорганізми роду *Bacillus*) і віруліцидну дію, включаючи віруси Avian influenza, Myxomatose virus, Newcastle disease virus.

Показання до застосування.

Засіб застосовують для профілактичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекції усіх видів тваринницьких і птахівничих приміщень, забійних і м'ясопереробних цехів, транспортних засобів, дезбар'єрів та інших об'єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду:

- у вогнищах інфекції бактеріальної, вірусної і грибової етіології;
- у клінічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних та інших профільних лабораторіях і ветеринарних клініках;
- в аптеках та аптечних ветеринарних закладах;
- у тваринницьких приміщеннях;
- на м'ясомолочних та молокопереробних підприємствах;
- на складах, елеваторах і зерносховищах;
- на підприємствах та об'єктах громадського харчування і торгівлі;
- на всіх видах транспорту (автомобільного, авіаційного, залізничного, водного), вокзалах, станціях і на об'єктах їхнього забезпечення;
- для дезінфекції систем вентиляції, кондиціонування;
- на підприємствах із збирання, транспортування, сортування та переробки сміття;
- для дезінфекції сміттєпроводів, сміттєзбиральних камер і контейнерів;
- для санітарного та спеціального одягу персоналу;
- як додатковий засіб у виробництві лікарських і косметичних препаратів;
- у побуті.

Дози і способи застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження. Робочі розчини готують шляхом додавання відповідних кількостей засобу до водопровідної води (температурою 10–35 °С), потім розчин перемішують.

Концентрація, %	Кількість препарату/води, л			
	На 10 л розчину (препарат / вода, л)		На 100 л розчину (препарат / вода, л)	
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99,0
1,25	0,125	9,875	1,25	98,75
2,25	0,225	9,775	2,25	99,5
3,0	0,3	9,7	3,0	97,0
50,0	5,0	5,0	50,0	50,0

Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення та аерозольного розпилення.
 Профілактична дезінфекція – 0,5 % розчин, 0,25–0,3 л/м², експозиція 30–60 хв.
 Вимушена/заклучна при бактеріальних інфекціях – 1,0 % розчин, 0,3–0,4 л/м², експозиція 2 години.
 При вірусних, 1,25 % і грибкових захворюваннях – 2,25 % розчин, 0,3–0,5 л/м², експозиція 3 години.
 При спороутворюючих мікроорганізмах (*Bacillus subtilis*) – 3,0 % розчин, 1 л/м², експозиція 3 години.
 Аерозольна дезінфекція – 50 % розчин, 1,5 мл/м³, експозиція 6 годин (температура ≥ 15 °C, вологість ≥ 60 %; при нижчій вологості попередньо розпилити воду 10 мл/м³).
 Дезінфекція транспортних засобів – 0,5 % розчин, 0,3 л/м², експозиція 20 хвилин.
 Заправка дезбар'єрів і дезкилимків – 0,5 % розчин (заміна кожні 7 діб або при забрудненні).
 Дезінвазія приміщень, вигульних двориків і площадок з твердим покриттям – 2 % розчин, 500 мл/м², експозиція 2 години.
 Після дезінфекції обов'язково провітрити приміщення та промити водою всі поверхні, що контактували з кормами та питною водою.
 Для заповнення дезбар'єрів та дезкилимків використовують 1,0 % робочий розчин препарату, який замінюють по мірі забруднення або кожні 7 діб.
 Після проведення дезінфекції необхідно провітрити приміщення та промити водою всі поверхні, що будуть контактувати з кормами та питною водою.

Рекомендовані концентрації залежно від типу інфекції

Бактеріальні інфекції	1,0 %
Вірусні інфекції	1,25 %
Грибкові інфекції	2,25 %
Спороутворюючі бактерії	3,0 %
Профілактика/транспорт	0,5 %
Аерозоль	50,0 %

Спеціальні застереження.

Не застосовувати в присутності тварин і птиці. При використанні в термічному туманогенераторі з'являється гострий неприємний запах – після експозиції приміщення необхідно провітрити. Обладнання та інвентар для годування звільнити від залишків корму та води перед дезінфекцією.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

До роботи не допускаються особи молодше 18 років. Роботи проводити в спецодязі, універсальному респіраторі, захисних окулярах, гумових рукавицях. При потрапленні в очі – промити водою і закапати 20 % розчин сульфацилу натрію (при болях – 1–2 % новокаїн). При потрапленні на шкіру – промити водою і змастити кремом. При потрапленні в шлунок – випити воду з активованим вугіллям (10–20 таблеток) і звернутися до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити руки та обличчя з милом.

Форми несумісності (основні).

Не застосовувати одночасно з іншими дезінфікуючими засобами. Не сумісний з милами, аніонними ПАР, концентрованими розчинами хлору, окисниками.

Особливі заходи зберігання.

Зберігати в тарі виробника при температурі від 5 °C до 20 °C у сухих, темних, добре вентильованих приміщеннях, захищених від прямого сонячного проміння. Термін придатності – 2 роки.

Форма випуску.

Каністри з поліетилену місткістю 1, 2, 5, 10, 20 л.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом.

Невикористаний засіб зберігати в щільно закритій тарі. Залишки розбавити водою до 0,01 % і змити в каналізацію або засипати адсорбентом і вивезти на полігон.

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «АРТІЦИД»

- Поєднання глутарового альдегіду, формальдегіду та дидецилдиметиламоній хлориду забезпечує потужну бактерицидну, віруліцидну, фунгіцидну та спороцидну дію.
- Висока ефективність проти вірусу пташиного грипу.

- Застосовується для всіх типів поверхонь.
- Не спричинює корозію.
- Ефективний у жорсткій воді.



ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

1. Механічне очищення
2. Первинне змивання водою
3. Миючі засоби (ФОМКЛІН / АВІКЛІН 0,8–1,5 % → 15–30 хв)
4. Ретельне промивання чистою водою
5. Висушування (рекомендується)
6. Дезінфекція (САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–3,0 % за інструкцією)
7. Заключне провітрювання / висушування

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT з повною ротацією препаратів

SHORT LIVING HENS (БРОЙЛЕРИ / ІНДИЧКИ) ВАРІАНТ 1	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–1,25 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30 хв
ГОДІВЛЯ	ЛІАЦИД 1 мл/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКИ / НЕСУЧКА) ВАРІАНТ 2	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ.	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1,0–2,25 %, 0,3–0,5 л/м², 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ/ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення ✕ зрошенням або піноутворювачем.
- Після експозиції обов'язково провітрити та промити поверхні, що контактують з кормами/водою.
- Не змішувати з лужними засобами, хлором, окисниками.
- Зберігати при 5–20 °С, термін придатності 2 роки.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com