

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

VITAKRESOL

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ

Засіб дезінфікуючий на основі хлоркрезолу, глутарового альдегіду, бензалконію хлориду та дидецилдиметиламонію хлориду

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.



Склад

ХЛОРКРЕЗОЛ	14,0 %
ГЛУТАРОВИЙ АЛЬДЕГІД	4,0 %
БЕНЗАЛКОНІУ ХЛОРИД	6,0 %
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНІУ ХЛОРИД	3,0 %
ВОДА ОЧИЩЕНА ТА ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ	до 100 %

Показання до застосування.

«Вітакрезол» призначений для профілактичної та вимушеної (поточної й заключної) дезінфекції усіх видів тваринницьких і птахівничих приміщень (свинокомплекси, скотарні, вівчарні тощо), птахівничих приміщень та інкубаторів, транспортних засобів для перевезення тварин і птиці, дезінфекційних бар'єрів і дезкилимків на в'їздах у господарства, а також технологічного обладнання, поверхонь та інвентарю, що підлягають державному ветеринарно-санітарному нагляду.

Завдяки синергічній комбінації чотирьох діючих речовин трьох хімічних класів (фенол, альдегід, четвертинні амонієві сполуки) засіб одночасно вражає кілька структур мікробної клітини – мембрану, клітинну стінку, ферментні системи та нуклеїнові кислоти, – що забезпечує широкий спектр дії (бактерії, включно зі спороутворюючими формами, ДНК- і РНК-вмісні віруси, включно з безоболонковими, дріжджові та плісняві гриби) і знижує ймовірність формування резистентності мікроорганізмів. Засіб зберігає активність у присутності органічних забруднень, жорсткої води та в широкому діапазоні температур (0–50°C); за температур нижче 0°C рекомендується додавання антифризу.

Способи застосування.

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження. Робочі розчини готують шляхом додавання відповідної кількості засобу до водопровідної води безпосередньо перед застосуванням. Дезінфекцію здійснюють методом зрошення, протирання або аерозольно. Після витримки часу експозиції місця можливого накопичення залишків засобу (годівниці, напувалки тощо) обов'язково промивають водою, а приміщення провітрюють.

Таблиця приготування робочих розчинів

Концентрація розчину (%) за препаратом	Вітакрезол (мл) на 1 л	Вода (мл) на 1 л	Вітакрезол (мл) на 10 л	Вода (мл) на 1 л
0,1	1	999	10	9990
0,2	2	998	20	9980
0,3	3	997	30	9970
0,5	5	995	50	9950
0,75	7,5	992,5	75	9925
1,0	10	990	100	9900

Рекомендовані концентрації залежно від мети дезінфекції

- Профілактична дезінфекція → 0,3–0,5 %.
- Вимушена (поточна, заключна) при бактеріальних інфекціях → 0,5–0,75 %.
- При вірусних інфекціях → 0,3–0,5 %.
- При грибкових захворюваннях (мікози, мікотоксикози) → 0,5–0,75 %.
- Заповнення дезбар'єрів і дезкилимків → 0,5–1,0 %.

Рекомендовані параметри застосування «Вітакрезолу»

№	Вид дезінфекції	Концентрація	Норма витрати	Експозиція	Метод
1	Профілактична дезінфекція	0,3–0,5 %	0,25–0,3 л/м²	30 хв / 1 год	Зрошення
2	Вимушена (поточна, заключна) при бактеріальних інфекціях	0,5–0,75 %	0,3–0,5 л/м²	1 год	Зрошення, протирання
3	При вірусних інфекціях	0,3–0,5 %	0,25–0,3 л/м²	60 хв	Зрошення
4	При грибкових захворюваннях (мікози, мікотоксикози)	0,5–0,75 %	0,3–0,5 л/м²	60 хв	Зрошення, протирання
5	Заповнення дезбар'єрів і дезкилимків	0,5–1,0 %	–	заміна щотижня / у міру забруднення	–

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ ВІТАКРЕЗОЛ

- Широкий спектр дії: одночасна бактерицидна, віруліцидна (щодо ДНК- і РНК-вмісних вірусів, включно з безоболонковими) та фунгіцидна активність в одному засобі.
- Синергізм чотирьох діючих речовин трьох хімічних класів дозволяє досягати ефективності за нижчих концентрацій, ніж у монокомпонентних аналогах, і знижує ризик формування резистентності мікроорганізмів.
- Ефективність зберігається за наявності органічного навантаження, жорсткої води та в широкому діапазоні температур (0–50°C).
- Сприятливий токсикологічний профіль: IV клас небезпеки (малотоксичні речовини) за нашкірного введення, відсутність кумулятивних ефектів у робочих концентраціях 0,3–0,5 %.
- Універсальність методів застосування – зрошення, протирання, аерозольне розпилення.
- Термін придатності 2 роки, зручне фасування (від 1 л до 200 л), що підходить як малим господарствам, так і промисловим комплексам.
- Вітчизняне виробництво (ТОВ «Санфорт-П», м. Київ).

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Працює в діапазоні температур 0–50°C; за температур нижче 0°C рекомендовано додавання антифризу для цілорічного застосування, зокрема в неопалюваних приміщеннях.
- Після завершення експозиції місця можливого накопичення залишків засобу (годівниці, напувалки тощо) обов'язково промивають водою, приміщення провітрюють.
- Не застосовувати одночасно з іншими дезінфікуючими засобами; активність знижується за наявності неіонних ПАВ.
- Не застосовувати засіб у присутності тварин і птиці.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

- До роботи із засобом не допускають осіб молодше 18 років. Дезінфекцію методом зрошення проводять із дотриманням заходів захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, універсальний респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). Приготування робочих розчинів необхідно проводити у провітрюваному приміщенні при наявності води.
- При появі ознак подразнення органів дихання необхідно припинити роботу, вивести постраждалого на свіже повітря, прополоскати рот і носоглотку водою та звернутися до лікаря. При потраплянні засобу в очі – промити проточною водою протягом 10–15 хвилин та звернутися до лікаря. При потраплянні на шкіру – промити водою та змастити пом'якшуючим кремом.
- При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно дати постраждалому випити декілька склянок води з подрібненими таблетками активованого вугілля та звернутися до лікаря.
- Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з дезінфекції. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом. Не застосовувати засіб у присутності тварин і птиці

Пакування: флакони та каністри з полімерних матеріалів місткістю 1, 5, 10, 20 л, а також діжки по 200 л.

Зберігання: засіб зберігають у тарі виробника, у сухих, темних, добре вентильованих приміщеннях за температури від 8 до 20 °C, окремо від інших речовин.

Термін придатності – 2 роки від дати виготовлення.

Якісна та регулярна дезінфекція – основна ланка протиепізоотичного захисту тваринницьких і птахівничих господарств, що безпосередньо визначає рівень біобезпеки виробництва.

ВІТАКРЕЗОЛ

Засіб дезінфікуючий на основі хлоркрезолу, глутарового альдегіду та четвертинних амонієвих сполук.

«Профілактична дезінфекція тваринницьких і птахівничих приміщень»

Застосування: планова профілактична дезінфекція приміщень для утримання тварин і птиці, інкубаторів, обладнання та інвентарю.

Рекомендація: зрошення 0,3–0,5 % розчином з розрахунку 0,25–0,3 л/м², експозиція 30 хв – 1 год.

Переваги: не викликає резистентності мікроорганізмів; ефективний за наявності органічного навантаження та жорсткої води; безпечний токсикологічний профіль (IV клас небезпеки).

«Вимушена дезінфекція при бактеріальних та вірусних інфекціях»

Застосування: поточна та заключна дезінфекція при спалахах бактеріальних і вірусних інфекцій (у т. ч. хвороба Ньюкасла, хвороба Ауескі, парвовірусна інфекція, тешовірусна інфекція).

Рекомендація: зрошення або протирання 0,5–0,75 % розчином (бактеріальні) чи 0,3–0,5 % розчином (вірусні інфекції), норма витрати 0,25–0,5 л/м², експозиція 60 хв.

Переваги: повна бактерицидна дія без бактеріостатичного ефекту; інактивує як ДНК-, так і РНК-вмісні віруси, включно з безоболонковими формами.

«Дезінфекція при грибкових захворюваннях (мікози, мікотоксикози)»

Застосування: знезараження поверхонь тваринницьких і птахівничих приміщень при мікозах і мікотоксикозах.

Рекомендація: зрошення або протирання 0,5–0,75 % розчином, норма витрати 0,3–0,5 л/м², експозиція 60 хв.

Переваги: 100 % деконтамінація тест-культур *Candida albicans* і *Aspergillus niger* на пористих (дерево, цегла, штукатурка) та гладких (залізо) поверхнях.

«Дезбар'єри та дезкилимки»

Застосування: постійне знезараження взуття та коліс транспорту на в'їздах у господарства.

Рекомендація: 0,5–1,0 % розчин, заміна щотижня або в міру забруднення/висихання.

Переваги: стабільна активність у широкому діапазоні температур і за наявності органічних забруднень; можливе застосування цілий рік за умови додавання антифризу при мінусових температурах.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.

Тел.: +38 097 420 9999

Email: sanfortp@gmail.com